

Triage testbeleid Covid-19 binnen verpleeghuis

Verenso, 26-03-2020

De patiënt heeft last van **minimaal twee** van de volgende symptomen:

- **Koorts** of een koortsachtig gevoel¹
- **Hoesten**
- **Kortademigheid**

Of er is Covid-19 verdenking op basis van de klinisch blik van de arts².

Ja

Zijn er al ≥ 2 vastgestelde Covid-19 besmettingen op de afdeling?

Ja

Einde Covid-19 triage

Vervolg lokaal uitbraakbeleid

Nee

- **Testen** op Covid-19³
- En patiënt **isoleren**

Test positief

- Patiënt blijven **isoleren/cohorteren**
- Verenso **behandeladvies** Covid-19 volgen

Nee

Einde Covid-19 triage

Test negatief

Isolatie opheffen

Einde Covid-19 triage.

Zo nodig richtlijn LLWI volgen

1. Ouderen ontwikkelen niet altijd koorts maar kunnen wel een koortsachtig gevoel hebben
2. Wees alert op patiënten met atypische presentatie van klachten, zeker als die niet passend zijn bij bekende episodes of verklaarbaar zijn door onderliggende bekende oorzaak.
3. Stem met het laboratorium af of ook andere virale diagnostiek gelijktijdig ingezet kan worden (denk bijvoorbeeld aan influenza of RS).